

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
Γ' ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ**

*(Ενδεικτικές Απαντήσεις)*

**ΘΕΜΑ Α**

**A1.** Απόδειξη σχολικού βιβλίου σελ 135

**A2. α.** Ψευδής (ορθή εκφώνηση σελ 99)

**β.** Αντιπαράδειγμα σχολικού βιβλίου σελ 99

**A3** Σελίδα 73

**A4 α)** Λάθος

**β)** Σωστό

**γ)** Λάθος

**δ)** Σωστό

**ε)** Σωστό

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Για τη σύνθεση της  $g$  με την  $f$  βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της

$$A_{f \circ g} = \left\{ x \in A_g \text{ και } g(x) \in A_f \right\}$$

Δηλαδή :  $x \neq 1$  και  $\frac{x}{1-x} > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$

Επομένως ορίζεται η συνάρτηση  $f \circ g$  με πεδίο ορισμού  $A_{f \circ g} = (0,1)$  και τύπο

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \ln \frac{x}{1-x}$$

**B2.** Για τη συνάρτηση  $h(x) = \ln \frac{x}{1-x}$  με  $A_h = (0,1)$  έχουμε

$h(x) = \ln x - \ln(1-x)$  η οποία είναι παραγωγίσιμη στο  $A_h = (0,1)$  με παράγωγο

$h'(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} > 0$  για κάθε  $x \in (0,1)$  επομένως η  $h$  είναι γνησίως αύξουσα

άρα και 1-1 επομένως αντιστρέφεται .

Το πεδίο ορισμού της  $h^{-1}$  είναι το σύνολο τιμών της  $h$  .

Η  $h$  συνεχής και γνησίως αύξουσα στο  $A_h = (0,1)$  επομένως το σύνολο τιμών

της είναι :  $h(A_h) = \left( \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x), \lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) \right) = (-\infty, +\infty)$  διότι :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \ln(1-x)) = (-\infty) - 0 = -\infty$$

και

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (\ln x - \ln(1-x)) = 0 - (-\infty) = +\infty$$

Άρα το πεδίο ορισμού της  $h^{-1}$  είναι  $A_{h^{-1}} = (-\infty, +\infty)$  και ο τύπος της :

$$\begin{aligned} h(x) = y &\Leftrightarrow \ln \frac{x}{1-x} = y \Leftrightarrow \frac{x}{1-x} = e^y \Leftrightarrow x = e^y - xe^y \\ &\Leftrightarrow x + xe^y = e^y \Leftrightarrow x(1+e^y) = e^y \Leftrightarrow x = \frac{e^y}{1+e^y}, y \in (-\infty, +\infty) \end{aligned}$$

Επομένως  $h^{-1}(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}, x \in (-\infty, +\infty)$

**B3.** Η  $\varphi$  παραγωγίσιμη στο σύνολο των πραγματικών αριθμών με

$$\varphi'(x) = \frac{(e^x)'(e^x + 1) - e^x(e^x + 1)'}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0 \text{ για κάθε}$$

$x \in (-\infty, +\infty)$  επομένως η  $\varphi$  γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της και δεν παρουσιάζει ακρότατα .

Για τα διαστήματα κυρτότητας θα βρούμε τη δεύτερη παράγωγο της  $\varphi$

$$\begin{aligned}\varphi''(x) &= \frac{(e^x)'(e^x+1)^2 - e^x((e^x+1)^2)'}{(e^x+1)^4} = \frac{e^x(e^x+1)^2 - e^x 2(e^x+1)(e^x+1)'}{(e^x+1)^4} \\ &= \frac{e^x(e^x+1)^2 - 2e^{2x}(e^x+1)}{(e^x+1)^4} = \frac{e^x(e^x+1)(e^x+1-2e^x)}{(e^x+1)^4} = \frac{e^x(1-e^x)}{(e^x+1)^3}\end{aligned}$$

Για τις ρίζες και το πρόσημο της  $\varphi''$  έχουμε τα παρακάτω :

$$\varphi''(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - e^x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$\varphi''(x) > 0 \Leftrightarrow 1 - e^x > 0 \Leftrightarrow x < 0$$

$$\varphi''(x) < 0 \Leftrightarrow 1 - e^x < 0 \Leftrightarrow x > 0$$

Στο διάστημα  $(-\infty, 0]$  η  $\varphi$  είναι κυρτή ενώ στο διάστημα  $[0, +\infty)$  η  $\varphi$  είναι κοίλη. Το σημείο  $(0, \varphi(0))$  δηλαδή το  $(0, \frac{1}{2})$  είναι το σημείο καμπής .

**B4.** Για τις οριζόντιες ασύμπτωτες της  $\varphi$  έχουμε :

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{0}{0+1} = 0$  άρα η ευθεία  $y = 0$  είναι οριζόντια ασύμπτωτη της  $C_\varphi$  στο  $-\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$  άρα η ευθεία  $y = 1$  είναι οριζόντια ασύμπτωτη της  $C_\varphi$  στο  $+\infty$

Η γραφική παράσταση φαίνεται παρακάτω:



## ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Έστω  $M(x_0, f(x_0))$  σημείο της  $C_f$  η εξίσωση της εφαπτομένης της στο  $M$  είναι

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Για να υπάρχουν δύο ακριβώς εφαπτόμενες που άγονται από το  $A$  θα πρέπει το σημείο  $A$  να ανήκει στην  $(\varepsilon)$  άρα:  $-\frac{\pi}{2} + \eta\mu x_0 = -\sigma\upsilon\nu x_0 \left(\frac{\pi}{2} - x_0\right)$  και η τελευταία εξίσωση να έχει δύο ακριβώς ρίζες.

Θεωρούμε τη συνάρτηση  $g(x) = -\frac{\pi}{2} + \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x \left(\frac{\pi}{2} - x\right)$  με  $x \in [0, \pi]$

Η  $g$  παραγωγίσιμη στο  $(0, \pi)$  με  $g'(x) = \eta\mu x \left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \eta\mu x \left(x - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ διότι } \eta\mu x \neq 0 \text{ για κάθε } x \in (0, \pi)$$

$$g'(x) > 0 \Leftrightarrow \eta\mu x \left(x - \frac{\pi}{2}\right) > 0 \Leftrightarrow x > \frac{\pi}{2} \text{ διότι } \eta\mu x > 0 \text{ για κάθε } x \in (0, \pi)$$

$x$	0	$\frac{\pi}{2}$	$\pi$
$g'(x)$		-	+
$g(x)$		$\searrow$	$\nearrow$

Στο  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  η  $g$  είναι γνησίως φθίνουσα ενώ στο  $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$  είναι γνησίως αύξουσα

Δηλαδή η εξίσωση  $g(x) = 0$  έχει δύο ακριβώς ρίζες στο  $[0, \pi]$  τις  $x = 0$  και  $x = \pi$  οι οποίες εμφανίζονται στα άκρα του πεδίου ορισμού.


Οι εφαπτόμενες της  $f$  στα σημεία  $(0, f(0))$  και  $(\pi, f(\pi))$  είναι αντίστοιχα

$$(\varepsilon_1): y - f(0) = f'(0)(x - 0) \Leftrightarrow y = x$$

$$(\varepsilon_2): y - f(\pi) = f'(\pi) \cdot (x - \pi) \Leftrightarrow y = x - \pi$$

Γ2. Βρίσκουμε το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ

οπou  $O(0,0)$   $A\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$  και  $B(0,\pi)$  .



$$E_{OAB} = \frac{\frac{\pi}{2} \cdot \pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}$$

$$E_2 = \int_0^{\pi} |f(x)| dx = \int_0^{\pi} \eta \mu x dx = [-\sigma \nu x]_0^{\pi} = -\sigma \nu \pi + \sigma \nu 0 = 2$$

$$E_1 = E_{OAB} - E_2 \Leftrightarrow E_1 = \frac{\pi^2}{4} - 2$$

$$\text{Άρα } \frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{\pi^2}{4} - 2}{2} = \frac{\pi^2}{8} - 1$$

Γ3. Για το ζητούμενο όριο έχουμε :

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f(x) + x}{f(x) - x + \pi} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f(x) + x}{f(x) - (x - \pi)} = \lim_{x \rightarrow \pi} \left[ (f(x) + x) \frac{1}{f(x) - (x - \pi)} \right]$$

Η συνάρτηση  $f(x) = -\eta \mu x$  είναι κυρτή στο  $[0, \pi]$  άρα η εξίσωση εφαπτομένης της βρίσκεται κάτω από αυτήν με εξαίρεση το σημείο επαφής

Δηλαδή ισχύει :

$$f(x) \geq x - \pi \Leftrightarrow f(x) - x + \pi \geq 0 \text{ και το ίσον ισχύει μόνο για } x = \pi$$

Άρα για  $x \rightarrow \pi$  ισχύει  $f(x) - x + \pi > 0$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow \pi} (f(x) - x - \pi) = 0 \text{ άρα : } \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1}{f(x) - (x - \pi)} = +\infty$$

**Γ4.** Από το **Γ3** έχουμε :

$$f(x) > x - \pi \text{ για κάθε } x \in [1, e] \text{ άρα :}$$

$$\frac{f(x)}{x} > 1 - \frac{\pi}{x} \Rightarrow \int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > \int_1^e \left(1 - \frac{\pi}{x}\right) dx \Rightarrow \int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > [x - \pi \ln x]_1^e$$

$$\Rightarrow \int_1^e \frac{f(x)}{x} dx > e - \pi - 1$$

## ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.** Η  $f$  είναι συνεχής στο  $[-1, 0)$  ως ρίζα συνεχούς.

Η  $f$  είναι συνεχής στο  $(0, \pi]$  ως γινόμενο συνεχών.

Για την συνέχεια στο 0 έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x \eta \mu x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

Άρα η  $f$  είναι συνεχής στο πεδίο ορισμού της.

$$\text{Για } x \in [-1, 0) \text{ έχουμε : } f'(x) = \left( (x^4)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (x^4)^{-\frac{2}{3}} \cdot 4x^3 \neq 0$$

$$\text{Για } x \in (0, \pi] \text{ } f'(x) = e^x (\eta \mu x + \sigma \upsilon \nu x)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \eta \mu x + \sigma \upsilon \nu x = 0 \Leftrightarrow \eta \mu x = -\sigma \upsilon \nu x \Leftrightarrow \epsilon \phi x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{3\pi}{4}$$

άρα το σημείο  $x = \frac{3\pi}{4}$  είναι κρίσιμο.

$$\text{Για το σημείο } 0 \text{ έχουμε } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{x^4}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| \cdot \sqrt[3]{|x|}}{x} = 0$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x \eta \mu x}{x} = 1$  άρα η  $f$  δεν είναι παραγωγίσιμη στο 0 οπότε το 0 είναι κρίσιμο σημείο της  $f$ .

**Δ2.** Για  $x \in (0, \pi) : f'(x) = e^x \cdot (\eta \mu x + \sigma \upsilon \nu x)$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \eta \mu x > -\sigma \upsilon \nu x \Leftrightarrow \sigma \phi x > -1 \Leftrightarrow \sigma \phi x > \sigma \phi \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow x < \frac{3\pi}{4}$$

άρα η μονοτονία της  $f$  είναι:

$f$  γνησίως φθίνουσα στο  $[-1, 0]$ ,  
 $f$  είναι γνησίως αύξουσα στο  $\left[0, \frac{3\pi}{4}\right]$ ,  
 $f$  είναι γνησίως φθίνουσα στο  $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$

και παρουσιάζει τοπικά ακρότατα τα

$$f(-1) = 1, f(0) = 0, f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = e^{\frac{3\pi}{4}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, f(\pi) = 0$$

και το σύνολο τιμών της είναι  $f(A) = \left[0, e^{\frac{3\pi}{4}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$  προφανώς είναι  $e^{\frac{3\pi}{4}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} > 1$

**Δ3.** Βρίσκουμε τα κοινά τους σημεία λύνοντας την εξίσωση

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow e^x \eta \mu x = e^{5x} \Leftrightarrow \eta \mu x = e^{4x}$$

η οποία προφανώς είναι αδύνατη γιατί  $x > 0$ .

Διότι : κάθε  $x > 0 \Leftrightarrow e^x > 1$  και για κάθε  $x > 0 -1 \leq \eta \mu x \leq 1$

Το εμβαδόν του χωρίου είναι  $E = \int_0^\pi |e^x \eta \mu x - e^{5x}| dx$  τώρα βρίσκουμε το πρόσημο της  $e^x (\eta \mu x - e^{4x})$  το οποίο είναι προφανώς αρνητικό για κάθε  $x > 0$

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^\pi e^x \eta \mu x dx = \left[ e^x \eta \mu x \right]_0^\pi - \int_0^\pi e^x \sigma \upsilon \nu x dx = \\ &= 0 - \left( \left[ e^x \sigma \upsilon \nu x \right]_0^\pi - \int_0^\pi e^x (-\eta \mu x) dx \right) = - \left[ e^x \sigma \upsilon \nu x \right]_0^\pi + \int_0^\pi e^x \eta \mu x dx \end{aligned}$$

$$\text{άρα } 2I_1 = e^\pi + 1 \Rightarrow I_1 = \frac{e^\pi + 1}{2}$$

$$I_2 = \int_0^\pi e^{5x} dx = \left[ \frac{e^{5x}}{5} \right]_0^\pi = \frac{e^{5\pi} - 1}{5}$$

άρα

$$E = -I_1 + I_2 = \frac{e^\pi + 1}{2} + \frac{e^{5\pi} - 1}{5}$$

**Δ4.** Η εξίσωση γίνεται

$$\begin{aligned} e^{-\frac{3\pi}{4}} \left( 16f(x) - 16 \left( x - \frac{3\pi}{4} \right)^2 \right) &= 8\sqrt{2} \Leftrightarrow \left( f(x) - \left( x - \frac{3\pi}{4} \right)^2 \right) = e^{\frac{3\pi}{4}} \eta\mu \frac{3\pi}{4} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(x) - f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \left( x - \frac{3\pi}{4} \right)^2 \end{aligned}$$

από το ολικό μέγιστο της  $f$  το πρώτο μέλος είναι μικρότερο ίσο από το μηδέν ενώ το δεύτερο μέλος μεγαλύτερο ίσο από το μηδέν κατά συνέπεια η εξίσωση έχει μόνο μία ρίζα το  $\frac{3\pi}{4}$